

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Schrödinger Denklemi  
Tamamıyla Çözülebilir

Doğan Dibeççi

Doktora Tezi

Y.Ü. Kocaeli Mühendislik Fakültesi

**SCHRÖDİNGER DENKLEMİNİ  
TAMAMIYLA ÇÖZÜLEBİLİR KILAN  
POTANSİYEL SINIFLARI**

Doğan Dibekçi

Doktora Tezi

Yönetici : Doç. Dr. Haluk Beker

•

Jüri : Prof. Rüçhan Yarasa

Doç. Dr. Ömür Akyüz

Yıldız Üniversitesi  
İstanbul, Mart 1983

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ

D.B. No. 42730

*Comp.*

**SCHRÖDİNGER DENKLEMİNİ  
TAMAMIYLA ÇÖZÜLEBİLİR KILAN  
POTANSİYEL SINIFLARI**

Doğan Dibekçi


Doktora Tezi

Yıldız Üniversitesi  
İstanbul, Mart 1983

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ  
GENEL KİTAPLIĞI

R 209

Kot : ..... 58 .....  
Alındığı Yer : Fen Bil. Enst. ....  
Tarih : ..... 26/5/1987 .....  
Fatura : ..... - .....  
Fiatı : ..... 1000Tl. ....  
Ayniyat No : ..... 1/6 .....  
Kayıt No : ..... 44821 .....  
UDC : ..... 530.4 ..... 373.242 .....  
Ek : .....



## TEŞEKKÜR

Bu çalışmada gösterdiği içten destek ve yardımları için tez yöneticim Sayın Doç. Dr. Haluk Beker'e ,

Çok faydalı uyarıları ve ilgileri için hocamız Sayın Prof. Dr. Asım Orhan Barut'a ,

Lisansüstü öğrenimimde ve araştırmalarımında sürekli ilgi ve desteklerini esirgemiyen Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Elemanlarına içtenlikle teşekkür ederim.

## ÖZET

Verilen herhangi ikinci dereceden bir diferansiyel operatör dönüşümlerle

$$\mathbb{A}_G = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2} S(G) + \left( -\left(\frac{F_1}{2F_2}\right)' - \left(\frac{F_1}{2F_2}\right)^2 + \frac{F_0}{F_2} \right) \right\}$$

biçimine getirilip, Schrödinger operatörü

$$\mathbb{A}_S = \left\{ 1, 0, -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \right\}$$

ile karşılaştırıldı. Ortaya çıkan lineer olmayan diferansiyel denklemin " sabitle eşleştirilme " yöntemi ile bulunan çözümlerin yardımı ile Schrödinger denkleminin tam çözülebilirliğini sağlayan potansiyel sınıfları elde edildi.

Konfluent hipergeometrik diferansiyel denklem için aynı sonuçlar dinamik gruplardan  $SU(1,1)$  'in özellikleri kullanılarak da elde edilerek, analiz ve grup teoritik yöntemler arasındaki uyum vurgulandı.

ABSTRACT

A general second order differential operator

$$\mathbb{L} = \left\{ F_2, F_1, F_0 \right\}$$

corresponding the differential equation

$$\left( F_2 \frac{d^2}{dz^2} + F_1 \frac{d}{dz} + F_0 \right) \omega = 0$$

is put into the form

$$\mathbb{A}_G = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2} S(G) + \left( - \left( \frac{F_1}{2F_2} \right)' - \left( \frac{F_1}{2F_2} \right)^2 + \frac{F_0}{F_2} \right) \right\}$$

after several transformations. Comparison with the Schrödinger operator

$$\mathbb{A}_S = \left\{ 1, 0, - \frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \right\}$$

yields a highly non-linear differential equation.

The class of potentials that give rise to completely integrable systems are found for a given differential equation.

The results for the confluent hypergeometric differential equation is identical to that of a group theoretical approach using the dynamical group  $SU(1,1)$ .

## İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ	1
II. İNVARYANT FORM	3
III. PUCHS DİFERANSİYEL DENKLEMİ	5
IV. YÖNTEM VE UYGULANIŞI	7
Euler Diferansiyel Denklemi	9
Konfluent Hipergeometrik D. D.	11
Hipergeometrik D. D.	14
V. CEBİRSEL KÖKENLER	19
Radyal Momentumun Dinamik Özellikleri	20
SU(1,1) Jeneratörlerinin İnşası ve İndirgemeler	22
Schrödinger Denklemine Uygulama	25
Örnekler	27
VI. SONUÇ	32
VII. KAYNAKLAR VE NOTLAR	33
VIII. EKLER	35



## I. GİRİŞ

Kuantum mekaniği problemlerinin çözümlenmesinde kullanılan yöntemlerde yapılan temel işlem, bunların özdeğer eşitliklerine uygun matematiksel kalıpları bulup gerekli dönüşümleri yaparak çözüme varmak şeklindedir. (1) Fiziksel koşulların tam olarak belirlenebildiği problemlerde kullanılabilen bu yapı özel bir diferansiyel denklemden hareket edilerek özel bir Schrödinger denklemini vermektedir. Matematiğin özel bazı denklemlerinin ön plana çıktığı ve çözümlerin bu fonksiyonlar çerçevesinde arandığı bilinen bir gerçektir. (2,3,4)

Bu özel eşitliklerin kökeni araştırıldığında çoğunlukla düzgün tekil noktalar civarında serilere açılabilen çözümler veren Fuchs tipi diferansiyel denklemlere varıldığı görülmektedir. (4,5)

Verilen en genel ikinci derece diferansiyel denklemden hareket edildiğinde elde edilebilecek çözümler ve bunlara karşılık gelecek potansiyel sınıflarının neler olabileceği düşüncesi enteresan sonuçlar verebilir. Bunun için Fuchs diferansiyel denklemi uygun dönüşümlerle genel Schrödinger denklemine benzetilirse elde edilen ifade genel Schrödinger denklemi ile mukayese edildiğinde lineer olmayan bir diferansiyel denklemle karşılaşılır. İlk bakışta çok karmaşıkmiş gibi görünen bu denklem değişik bir yak-

lařımla irdelendiğinde kuantum mekaniđi problemlerinde sık sık karřımıza çıkan potansiyel sınıfları elde edilebilir. Deđişik bir yaklaşım olması bakımından son bölümde,  $SU(1,1)$  Lie cebirini kullanılarak bulunan sonuçları analiz yoluyla elde edilen sonuçlarla karşılařtırmak mümkündür.

## II. İNVARYANT FORM

İkinci dereceden en genel bir diferansiyel denklem :  $F_0(z)$   
 $F_1(z), F_2(z)$  çarpan fonksiyonları,  $W(z)$  denklemi sağlayan  
 herhangi bir çözüm olmak üzere

$$F_2(z) W''(z) + F_1(z) W'(z) + F_0(z) W = 0 \quad (\text{II.1})$$

şeklinde ifade edilir. Denklemi ikinci dereceden bir  
 lineer diferansiyel operatör yardımıyla ifade etmek is-  
 tedığımızda

$$\mathbb{L} \equiv \{ F_2, F_1, F_0 \}$$

tanımıyla

$$\mathbb{L} W = F_2 W'' + F_1 W' + F_0 W = 0 \quad (\text{II.2})$$

şeklinde yazabiliriz.  $\mathbb{L}$  operatörünün hermitsel olma-  
 sı Fizik ve Uygulamalı Matematikte özel bir önem taşı-  
 dığından,

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}^\dagger$$

olması için gerekli şartı araştırmak faydalı olacaktır.

Önce

$$\mathbb{L}^\dagger W = F_2 W'' + (2F_2' - F_1) W' + (F_2'' - F_1' - F_0) W$$

olduğu hatırlanıp karşılaştırma yapılırsa  $\mathbb{L} = \mathbb{L}^\dagger$  olabil-  
 mesi için  $F_2' = F_1$  'in gerek ve yeter şart olduğu ortaya  
 çıkar.

Şayet başlangıçta  $F_2' = F_1$  olması sağlanamıyorsa bir ben-  
 zerlik dönüşümü ile

$$\bar{S}^1 \mathbb{L} S \bar{S}^1 W = 0$$

$$\text{veya } \mathbb{A} = \bar{S}^1 \mathbb{L} S \quad \Psi = \bar{S}^1 W$$

tanımlarıyla

$$\Delta \Psi = 0 \quad (II.3)$$

elde edilir.  $\Delta$ 'nın hermitsel bir operatör olması için

$S(z)$  'nin ne olması gerektiği bulunabilir.

(II.3) denklemi açık biçimde yazıldığında

$$\Delta \Psi = \bar{S}' \left[ F_2 \frac{d^2}{dz^2} + F_1 \frac{d}{dz} + F_0 \right] S \bar{S}' \Psi = 0$$

veya

$$\bar{S}' F_2 \frac{d^2}{dz^2} S \Psi + \bar{S}' F_1 \frac{d}{dz} S \Psi + \bar{S}' F_0 S \Psi = 0$$

$$\bar{S}' F_2 (S \Psi'' + 2S' \Psi' + S'' \Psi) + \bar{S}' F_1 (S \Psi' + S' \Psi) + F_0 \Psi = 0$$

elde edilir. Yeniden düzenleme yapılırsa

$$F_2 \Psi'' + (2F_2 \frac{S'}{S} + F_1) \Psi' + (F_2 \frac{S''}{S} + F_1 \frac{S'}{S} + F_0) \Psi = 0$$

bulunur.  $\Delta = \Delta^+$  olması şartının

(II.4)

$$F_2' = 2F_2 \frac{S'}{S} + F_1$$

olduğu, dolayısıyla  $S(z)$  için

$$S = \sqrt{F_2} e^{-\frac{1}{2} \int \frac{F_1}{F_2} dz} \quad (II.5)$$

hesaplanır. Sonuç Sonin-Polya teoremine uygundur.<sup>(6)</sup> Bu

durumda denkleminiz

$$\Psi'' + \frac{F_2'}{F_2} \Psi' + \left( \frac{F_2'' - F_1'}{2F_2} - \frac{(F_2' - F_1)^2}{4F_2^2} + \frac{F_0}{F_2} \right) \Psi = 0 \quad (II.6)$$

şekline girer. (Ek I).

Elde ettiğimiz bu yeni denklemi istediğimiz biçimde şek-

killendirebilmemiz için basit bir operasyon yeterli ol-

maktadır. (II.2) ifadesini önce standart forma sokup

$$W'' + P W' + Q W = 0 \quad (II.7)$$

şeklinde ifade ederiz. Şimdi  $F_2=1$  olacağı için  $F_2'=0$  o-

dur. Yeni durumda (II.5) eşitliğinin ifadesi

$$\Psi'' + \left[ -\left(\frac{F_1}{2E_2}\right)' - \left(\frac{F_1}{2E_2}\right)^2 + \frac{F_2}{E_2} \right] \Psi = 0 \quad (\text{II.8})$$

olacaktır. Schrödinger denkleminde eşdeğer olan bu sonuç matematikte " İnvaryant Form " olarak adlandırılmaktadır

### III. FUCHS DİFERANSİYEL DENKLEMİ

Kompleks düzlemde, en kötü ihtimalle  $z = \infty$  da dahil olmak üzere, tekil noktaları düzgün olan homojen lineer eşitliklere Fuchs tipi diferansiyel denklemler adı verilir. Tanım gereği bu denklemlerin düzgün olmayan tekil noktaları yoktur.

En genel formda birinci dereceden bir Fuchs diferansiyel denklemi

$$w'(z) + \left( \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{z-z_k} \right) w(z) = 0 \quad (\text{III.1})$$

şeklinde dir. Denklem in çözümü

$$w(z) = \prod_{k=1}^n (z - z_k)^{-A_k}$$

elemanter bir fonksiyondur.

İkinci dereceden Fuchs diferansiyel denklemi  $p(z)$ ,  $q(z)$  çarpan fonksiyonları olmak üzere

$$w'' + p(z) w' + q(z) w = 0 \quad (\text{III.2})$$

şeklinde verilir. Denklem ihtiva ettiği tekil nokta sayısına bakılarak özel adlarla anılmaktadır.

Örneğin  $z = z_1$ 'de tekil noktalı Fuchs diferansiyel denklemi

$$w'' - \frac{2}{z-z_1} w' = 0 \quad (\text{III.3})$$

olup  $a_1$  ve  $a_2$  herhangi iki sabit ise

$$w = a_2 - \frac{a_1}{z-z_1}$$

çözümünü vermektedir.  $z=\infty$ 'da tekil noktalı diğer

Fuchs diferansiyel denklemi

$$w'' = 0 \quad (\text{III.4})$$

olup çözümü

$$w = a_1 z + a_2$$

şeklindedir.

Tekil noktaları  $z=z_1$  ve  $z=\infty$ 'da olan iki tekil noktalı denklem

$$w'' + \frac{k_1}{z-z_1} w' + \frac{k_2}{(z-z_1)^2} w = 0 \quad (\text{III.5})$$

dır.  $k_1$  ve  $k_2$  iki sabit olmak üzere Euler diferansiyel denklemine eşdeğer olan denklem  $z=z_1$  civarında A ve B keyfi sabitler olup

$$w = A (z - z_1)^{c_1} + B (z - z_1)^{c_2}$$

çözümünü vermektedir.

Üç tekil noktalı bir Fuchs diferansiyel denklemi

$$w'' + \left( \frac{A_1}{z-z_1} + \frac{A_2}{z-z_2} \right) w' + \left( \frac{B_1}{(z-z_1)^2} + \frac{B_2}{(z-z_2)^2} \right) w = 0 \quad (\text{III.6})$$

olup çözümler elemanter fonksiyonlara indirgenemezler.

Bağımsız değişkenlerin lineer kısmi dönüşümleri ile bu tekil noktalar  $0, 1$  ve  $\infty$ 'a yerleştirilebilir. Gauss'un hipergeometrik diferansiyel denklemi

$$z(1-z)w'' + [c - (a+b+1)z]w' - abw = 0 \quad (\text{III.7})$$

bu şartları taşıyan, hipergeometrik serilere açılabilen çözümler vermektedir.

$$w_1(z) = F(a, b, c; z)$$

$w_2(z) = F(a+1-c, b+1-c, 2-c; z) z^{1-c}$   
 çözümlerden ikisi olup  $0 < |z| < 1$  ve  $c > 0$  olduğunda  
 $w_1$ ;  $c < 1$  olduğunda  $w_2$  geçerli çözüm olmaktadır.  $c = 1$   
 için  $w_1$  ve  $w_2$  aynı olur.

Şayet (III.7) denkleminde  $z$  yerine yeni bir bağımsız  
 değişken  $z \rightarrow \frac{z}{b}$  tanımlanır ise denklem

$$z \left(1 - \frac{z}{b}\right) w'' + \left[ c - z - (1+a) \frac{z}{b} \right] w' - a w = 0 \quad (\text{III.8})$$

olur ki tekil noktalar  $z=0$ ,  $z=b$  ve  $z=\infty$ 'dadır.

Şimdi  $b \rightarrow \infty$  seçilirse (III.8) denklemi

$$z w'' + (c - z) w' - a w = 0 \quad (\text{III.9})$$

konfluent hipergeometrik diferansiyel denklemine dönüşür

#### IV. YÖNTEM VE UYGULANIŞI

Verilen herhangi ikinci derece diferansiyel denklemi istenilen biçimde ifade etmek için izlenecek yol denklemi önce invaryant forma sokmak sonra değişken dönüşümü yapmak, ancak bu sırada invaryantlık bozulacağından tekrar invaryant forma getirmek şeklinde olacaktır. İnvaryant forma sokulan denklem Schrödinger denklemi ile karşılaştırılarak elde edilen lineer olmayan diferansiyel denkleme bulunabilecek çözümler, değişik seçimlerde değişik potansiyelleri belirlemektedir.

İkinci dereceden en genel diferansiyel denklemin operatörü

$$\mathbb{L} \equiv \{ F_2(z), F_1(z), F_0(z) \}$$

idi. İnvaryant forma sokulan bu denklemin operatörünün

yeni şekli

$$\mathbb{A} \equiv \left\{ 1, 0, -\left(\frac{F_1}{2F_2}\right)' - \left(\frac{F_1}{2F_2}\right)^2 + \frac{F_0}{F_2} \right\} \quad (\text{IV.1})$$

olmakta ve bu aşamada değişken dönüşümü yapıldığında

$$\mathbb{A}_G = \left\{ \frac{1}{G'^2}, -\frac{G''}{G'^3}, -\left(\frac{F_1}{2F_2}\right)' - \left(\frac{F_1}{2F_2}\right)^2 + \frac{F_0}{F_2} \right\}$$

elde edilmektedir. Ancak invaryantlık bozulduğundan, tekrarlanan benzer işlemler sonunda

$$\mathbb{A}_G = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2} \frac{G'''}{G'} - \frac{3}{4} \frac{G''^2}{G'^2} + \left( -\left(\frac{F_1}{2F_2}\right)' - \left(\frac{F_1}{2F_2}\right)^2 + \frac{F_0}{F_2} \right) G'^2 \right\} \quad (\text{IV.2})$$

arzulanan biçime sokulmaktadır.

Uygulamada bize tatmin edici fiziksel sonuçları verecek Fuchs tipi diferansiyel denklemler tekil nokta sayısı birden fazla olan ikinci derece denklemleri olacaktır. Ancak gelişmelerin gözlenebilmesi açısından bir tane düzgün tekil noktası olan (III.4) denklemi ile yöntemimizin uygulamasına başlayacağız.

$$w'' = 0$$

diferansiyel denkleminde operatörümüz

$$\mathbb{L} = \{ 1, 0, 0 \}$$

zaten invaryant formda olduğundan  $\mathbb{L} = \mathbb{A}$  dir.

$$\frac{d}{dG} = \frac{1}{G'} \frac{d}{dz}$$

değişken dönüşümünü uyguluyarak

$$\mathbb{A}_G = \left\{ \frac{1}{G'^2}, -\frac{G''}{G'^3}, 0 \right\}$$

bulunur. Denklemi  $G'^2$  ile çarpıp (IV.2)'deki son



şekline getirince

$$\mathbb{A}_G = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2} \frac{G'''}{G'} - \frac{3}{4} \frac{G''^2}{G'^2} \right\} \quad (\text{IV.3})$$

elde edilir. (IV.3) ifadesinde

$$S(G) = \frac{G'''}{G'} - \frac{3}{2} \frac{G''^2}{G'^2}$$

terimine  $G(r)$  fonksiyonunun Schwartziyenidir. Schwartziyenin sıfıra eşitlenmesi halinde elde edilecek çözüm,

$$G(x) = \frac{Ax + B}{Cx + D}$$

tekil nokta sayısı az olduğu zaman uygulanan Möbius transformasyonudur. (Ek II) .

$$w'' + \frac{k_1}{z-z_1} w' + \frac{k_2}{(z-z_1)^2} w = 0 \quad (\text{IV.4})$$

Euler diferansiyel denklemine eşdeğer olan denkleminiz  $(z-z_1) \rightarrow z$  şeklindeki bir transformasyonla

$$w'' + \frac{k_1}{z} w' + \frac{k_2}{z^2} w = 0$$

şekline getirilebilir. Bu değişiklik tekil noktayı  $z_1$  'den 0 'a taşımaktadır. Şimdi operatörümüz

$$\mathbb{L} = \left\{ 1, \frac{k_1}{z}, \frac{k_2}{z^2} \right\}$$

invariant forma sokulursa

$$\mathbb{A} = \left\{ 1, 0, \frac{k_1}{2z^2} - \frac{k_1^2}{4z^2} + \frac{k_2}{z^2} \right\}$$

olur.

$$\frac{d}{dG} = \frac{dz}{dG} \frac{d}{dz}$$

değişken dönüşümü yapıp yeniden düzenlendiğinde

$$K = \frac{1}{4} + k_2 - \left( \frac{k_1-1}{2} \right)^2$$

olmak üzere (IV.3) eşitliği

$$\Delta_G = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2} S(G) - K \frac{G'^2}{G^2} \right\} \quad (\text{IV.5})$$

şekline gelmektedir. Fiziksel sonuçlara varmak için (IV.5) eşitliğini Schrödinger operatörü

$$\Delta_S = \left\{ 1, 0, -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \right\} \quad (\text{IV.6})$$

ile karşılaştırmak gerekir. (IV.5) ve (IV.6) dan kolayca görülebileceği gibi karşılaştırma sonucu

$$\frac{1}{2} \frac{G'''}{G'} - \frac{3}{4} \frac{G''^2}{G'^2} - K \frac{G'^2}{G^2} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

lineer olmayan bir diferansiyel denklem elde ederiz. Denklemin sağ tarafındaki  $\frac{2mE}{\hbar^2}$  sabit terimine karşılık sol taraftaki terimlerden birinin <sup>sabite</sup> eşitlenmesi ve bu şartı sağlayan  $G(r)$  çözümünün kullanılması ile uygun potansiyelin tespit edilmesi sağlanır.

$$K \frac{G'^2}{G^2} = \text{sabit}$$

bize  $G(r)$  için  $G(r) = e^{ar}$  çözümünün bu şartı sağlayabileceğini gösterir. Bu çözüm kullanıldığında lineer olmayan diferansiyel denklemimiz

$$\left(K + \frac{1}{4}\right) a^2 = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

biçimini alır ve  $l=0$ ,  $V(r)=0$  olduğundan serbest parçacık problemine karşılık gelir.

Yöntemimizi (III.9) 'daki konfluent hipergeometrik diferansiyel denkleme uygulayalım.

Lineer diferansiyel operatörümüz

$$\mathbb{L} = \{ z, (c-z), -a \}$$

dir. Invaryant forma sokulduğunda

$$\mathbb{A} = \left\{ 1, 0, \frac{A}{z^2} + \frac{B}{z} + C \right\}$$

şeklinde ifade edilebilmektedir.

$$\frac{d}{dG} = \frac{dz}{dG} \frac{d}{dz}$$

değişken dönüşümüyle yeniden düzenlendiğinde

$$A = \frac{c}{2} - \frac{c^2}{4}$$

$$B = \frac{c}{2} - a$$

$$C = -\frac{1}{4}$$

olmak üzere

$$\mathbb{A}_G = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2}S(G) + A \frac{G'^2}{G^2} + B \frac{G'^2}{G} + C \right\}$$

biçimine indirgendiğini görürüz. Schrödinger operatörü

ile karşılaştırma yapıldığında,

$$\frac{1}{2} \frac{G'''}{G'} - \frac{3}{4} \frac{G''^2}{G'^2} + A \frac{G'^2}{G^2} + B \frac{G'^2}{G} + CG'^2 = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (\text{IV.7})$$

çözülmesi gereken lineer olmayan diferansiyel denklem

ortaya çıkar. Sabitlerin eşleştirilmesi yapıldığında:

$$i) \quad CG'^2 = \text{sabit}$$

şartı için  $G(r) = r$  çözümü geçerli olup denklemimiz

$$\frac{A}{r^2} + \frac{B}{r} + C = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

şeklini almaktadır. Bu seçim için geçerli potansiyel

$\frac{1}{r}$  ile orantılı olacağından Hidrojen atomu problemine  $\ell \neq 0$  için çözüm getirmektedir.

$$ii) \quad B \frac{G'^2}{G^2} = \text{sabit}$$

olması halinde  $G(r) = r^2$  çözümünün geçerli olacağı ve

$$\frac{4A+3/4}{r^2} + 4B + 4Cr^2 = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

eşitliğinin elde edildiği görülür. Eşleştirme yapıldığında bulunan potansiyel  $V(r) = \frac{1}{2} m\omega^2 r^2$  olup,  $\ell \neq 0$  için Harmonik Osilatör problemini çözdüğü görülmektedir.

iii)  $A \frac{G'^2}{G^2} = \text{sabit}$

şartını sağlayan çözüm

$$G(r) = e^{-ar}$$

gibi bir fonksiyon olmalıdır. Şimdi diferansiyel denklem

$$\left(A - \frac{1}{4}\right)a^2 + B a^2 e^{-ar} + C a^2 e^{-2ar} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

olur. Terimlerin eşleştirilmesi yapıldığında,

$$\ell = 0$$

$$-\frac{2mE}{\hbar^2} = A - \frac{1}{4} a^2$$

$$\frac{2mV(r)}{\hbar^2} = B a^2 e^{-ar} + C a^2 e^{-2ar}$$

elde edilmekte bu da iyi bilinen Morse Potansiyeli problemine çözüm getirmektedir.<sup>(7)</sup> ( Şekil:1 )

Tekil noktaları  $0, 1$  ve  $\infty$  'da olan Gauss'un Hipergeometrik diferansiyel denkleminin operatörü

$$\mathbb{L} = \left\{ z(1-z), c - (a+b+1)z, -ab \right\}$$

invariant forma sokulursa,

$$\mathbb{A} = \left\{ 1, 0, \frac{A}{z^2} + \frac{B}{z(1-z)} + \frac{C}{(1-z)^2} \right\}$$

elde edilir.

$$\frac{d}{dG} = \frac{dz}{dG} \frac{d}{dz}$$

değişken dönüşümüyle yeniden düzenlendiğinde

$$A = \frac{c}{2} - \frac{c^2}{4}$$

$$B = -ab - \frac{c(c-a-b-1)}{2}$$

$$C = -\frac{(c-a-b-1)}{2} - \frac{(c-a-b-1)^2}{4}$$

olmak üzere (EkIII)

$$\Lambda_G = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2}S(G) + A \frac{G'^2}{G^2} + B \frac{G'^2}{G(1-G)} + C \frac{G'^2}{(1-G)^2} \right\}$$

şekline gelmektedir. Schrödinger operatörü ile karşılaştırma yapıldığında,

$$\frac{1}{2} \frac{G'''}{G'} - \frac{3}{4} \frac{G''^2}{G'^2} + A \frac{G'^2}{G^2} + B \frac{G'^2}{G(1-G)} + C \frac{G'^2}{(1-G)^2} \equiv -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (\text{IV.8})$$

lineer olmayan diferansiyel denklemi elde ederiz. Sabitlerin eşleştirilmesi diye adlandıracağımız yöntemi kullandığımızda karşımıza mümkün olabilecek üç durum çıkmaktadır.

$$i) \quad C \frac{G'^2}{(1-G)^2} = \text{sabit}$$


şartını gerçekleyecek  $G(r)$  fonksiyonunun seçimi

$$G(r) = 1 - D e^{-ar}$$

şeklinde yapılmalıdır. Çözüm (IV.8) de yerine konduğunda,

$$\left(C - \frac{1}{4}\right)a^2 + \frac{Aa^2}{(\Delta e^{ar}-1)^2} + \frac{Ba^2}{(\Delta e^{ar}-1)} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

( Şekil:1 )



MORSE POTANSİYELİ : 
$$V(r) = V_0 \left( e^{-2(r-r_0)/a} - 2e^{-(r-r_0)/a} \right)$$
$$a = r_0/2$$

( İki atomlu moleküller için deneysel olarak bulunan potansiyel enerji fonksiyonunun Morse potansiyeline kesinlikle uyduğu görülmüştür. <sup>(8)</sup> )

$$ii) \quad B \frac{G'^2}{G(1-G)} = \text{sabit} \quad (IV.9)$$

şartını sağlayacak  $G(r)$  fonksiyonunun seçimi iki şekilde yapılabilmektedir.

$$G(r) = \text{Cosh}^2 ar$$

alındığında (IV.8) eşitliği

$$\frac{8a^2}{4} - \frac{3a^2}{4} (\tanh^2 ar + \text{Cotanh}^2 ar) - \frac{3a^2}{2} + 4a^2 A \tanh^2 ar - 4a^2 B + 4a^2 C \text{Cotanh}^2 ar = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

olur (EK IV).

Guruplandırma yapıldığında,

$$\tanh^2 ar (4a^2 A - \frac{3a^2}{4}) + \text{cotanh}^2 ar (4a^2 C - \frac{3a^2}{4}) = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2}$$

$$\text{sabit} = 4a^2 B - \frac{a^2}{2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} ; \quad l=0$$

bulunur.  $A = \frac{3}{16}$  seçildiğinde, potansiyel için geçerli seçim  $\text{cotanh}^2 ar$  tipinde,  $C = \frac{3}{16}$  seçildiğinde ise geçerli potansiyel tipinin  $\tanh^2 ar$  olacağı aşikardır.

$$G(r) = \cos^2 ar$$

çözümü için (IV.8) denkleminiz

$$-\frac{8a^2}{4} - \frac{3a^2}{4} (\tan^2 ar + \text{cotan}^2 ar) + \frac{3a^2}{2} + 4a^2 A \tan^2 ar + 4a^2 B + 4a^2 C \text{cotan}^2 ar = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

olmaktadır. Guruplandırma işlemi tekrarlandığında,

$$\tan^2 ar (4a^2 A - \frac{3a^2}{4}) + \text{cotan}^2 ar (4a^2 C - \frac{3a^2}{4}) = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2}$$

$$\text{sabit} = 4a^2 B - \frac{a^2}{2} = \frac{2mE}{\hbar^2} ; \quad l=0$$

bulunur. Bu durumda  $A = \frac{3}{16}$  seçildiğinde,  $\text{cotan}^2 ar$


bulunur. Sonuçta  $\ell=0$  halinde elde edilen potansiyel

$$B = \frac{2m}{\hbar^2} V_0 a_0^2 ; A=0 ; \Delta = -e^{-R/a_0} ; a_0 a = 1$$

olmak üzere

$$V(r) = - \frac{V_0}{1 + e^{(r-R)/a_0}}$$


şekline getirilebilir. Woods-Saxon potansiyeli olarak bilinen ve nükleer fizikte tek parçacık modellerinde en gerçekçi sonuçlara götüren potansiyel türüdür<sup>(9)</sup> (Şekil:2)




Şekil:2



tipi,  $C = \frac{3}{16}$  seçilirse  $\tan^2 ar$  tipi potansiyellerin geçerli olacağı ortaya çıkar. ( Şekil:3 ) 'de görülen  $V = V_0 \cot^2 ar$  potansiyelinin değişimi  $r$ 'ye göredir. Aynı şekilde  $V = V_0 \tan^2 ar$  potansiyelinin grafiği ise ( Şekil:4 ) 'te verilmiştir.



Şekil : 3



Şekil : 4

$$iii) \quad A \frac{G''}{G'} = \text{sabit}$$

şartını sağlayan çözüm

$$G(r) = D e^{ar}$$

gibi bir fonksiyon olmalıdır. Şimdi (IV.8) eşitliği,

$$\left(A - \frac{1}{4}\right) a^2 + \frac{B D a^2 e^{ar}}{(1 - D e^{ar})} + \frac{C D^2 a^2 e^{2ar}}{(1 - D e^{ar})^2} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

olur. Eşleştirme yapıldığında,

$$\frac{B e^{ar}}{(D e^{ar} - 1)} + \frac{C a^2}{(D e^{ar} - 1)^2} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2}$$

$$l=0 \quad ; \quad \left(A - \frac{1}{4}\right) a^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2}$$

bulunur. Bu aşamada

$$C=0 \quad ; \quad a a_0 = -1 \quad ; \quad \Delta = -e^{-\frac{R}{a_0}}$$

$$B = \frac{2m}{\hbar^2} V_0 a_0^2$$

seçilerek

$$V(r) = -\frac{V_0}{1 + e^{(r-R)/a_0}}$$

Woods-Saxon potansiyeli elde edilir. Dikkat edilirse

$A=0$  ve  $C=0$  için bulduğumuz çözümler bizi aynı potansiyel tipine götürmektedir.

## V. CEBİRSEL KÖKENLER

Bu dönüşümlerin alt yapısını açıklayan bir grup teori yaklaşımının olması doğaldır. Nitekim  $SU(1, 1)$  dinamik gurubunun jeneratörlerinin oluşturduğu "Spektrum Cebri" bu konuya açıklık getirmektedir. Kompakt olmayan gruplar

$O(2, 1) \sim SU(1, 1) \sim SL(2, R)$  ve bunların Lie cebirlerinin spektrumları birçok sistemin enerji seviyelerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.<sup>(12-14)</sup> Biz burada  $SU(1, 1)$  grubunu kullanarak bazı basit kuantal sistemleri inceleyip bulunan sonuçların diferansiyel denklemler teorisi ile tam bir uyum içinde olduğunu göstereceğiz. Bunun için önce  $SU(1, 1)$  grubunu ve jeneratörlerini kısaca inceleyeceğiz

v.1)  $SU(1, 1)$  Lie Cebri :

$SU(1, 1)$  Lie Cebrinin  $\Gamma_4, T$  ve  $\Gamma_0$  jeneratörleri aşağıdaki komütasyon bağıntılarını sağlarlar.

$$[\Gamma_4, T] = -i\Gamma_0$$

$$[T, \Gamma_0] = i\Gamma_4$$

$$[\Gamma_0, \Gamma_4] = iT$$

Casimir operatörünün  $\Gamma^2 = -\Gamma_4^2 - T^2 + \Gamma_0^2$

olduğu  $\Gamma^2$  ile birlikte köşegen hale getirilip spektrumu bulunacak operatörün  $\Gamma_0$  olması halinde tanımlanacak yaratma ve yok etme operatörleri

$$\Gamma_{\pm} = \Gamma_4 \pm iT$$

yardımıyla cebir

$$[\Gamma_0, \Gamma_{\pm}] = \pm \Gamma_{\pm}$$

$$[\Gamma_-, \Gamma_+] = 2\Gamma_0$$

şeklını alır. Casimir operatörü  $\Gamma^2$ 'nin özdeğeri  $\lambda(\lambda+1)$  olarak tanımlanırsa,  $\Gamma_0^2 \geq \Gamma^2$  olduğundan  $\Gamma_0$ 'ın spektrumunun  $\lambda+1$  ile  $+\infty$  ve  $-(\lambda+1)$  ile  $-\infty$  arasında bulunan iki ayrı parçadan oluştuğu ve  $\nu = 0, 1, 2, 3, \dots$  olmak üzere

$$\text{Spektrum}(\Gamma_0) = \pm(\nu + \lambda + 1)$$

olduğu bilinmektedir. Grubun birbirinden farklı dört tip üniter indirgenemez temsili olup biz  $\mathcal{D}^+$  diye bilinenini kullanıyoruz.<sup>(19)</sup>

## V.2) Radyal Momentumun Dinamik Özellikleri :

Radyal simetriye sahip sistemlerin Schrödinger denklemi

$$\mathcal{V}(r) \equiv \frac{2mV(r)}{\hbar^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} ; \quad \mathcal{E} \equiv \frac{2mE}{\hbar^2}$$

tanımlarıyla

$$[K^2 + \mathcal{V}(r) - \mathcal{E}]|\psi\rangle = 0$$

olarak yazılabilir. Bu denklemde radyal momentumu ifade eden  $K$ , veya koordinat gösterimindeki biçimiyle  $-i\left(\frac{d}{dr} + \frac{1}{r}\right)$ , dinamik simetrinin anahtarı olacaktır.

$r \equiv \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  değişkenlerine eşlenik ( $[r, K] = i$ ) ve hermitsel ( $K^\dagger = K$ ) bir operatör olan  $K$ 'nin toplam momentumla ilişkisi

$$|\vec{k}|^2 = K^2 + \frac{l(l+1)}{r^2}$$

ile verilir. Kuantal bir bağlı durumun kararlılık şartı fiziksel olarak kuvvet merkezinden dışa veya dıştan kuvvet merkezine bir akım olmamasıdır. Bu şart matematiksel olarak  $\langle K \rangle = 0$  denklemiyle ifade edilir. Bir boyutlu problemlerde görülen  $\langle k_x \rangle = 0$  gibi uzay tersinmesine bağlanamayan bu olgunun kökeni dinamiktir. Dinamik dengeğin bu belirtisi daha da genelleştirilerek belli şartlara uyan  $f = f(r)$  'lar için

$$\langle \sqrt{f(r)} K \sqrt{f(r)} \rangle = 0$$

olarak ta yazılabilir. Radyal Schrödinger denklemi.

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m} + V(r) - E \right] R = 0$$

nin çözümü  $R(r)$ , reel  $V(r)$  'lar için, daima reel olarak seçilebilir. Bunun nedeni her  $R(r)$  çözümü için  $R^*(r)$  ve dolayısıyla  $R(r) + R^*(r)$  'ın da çözüm olmasıdır. Böylece

$$\langle K \rangle \sim \int_0^{\infty} r^2 dr R(r) \left( \frac{d}{dr} + \frac{1}{r} \right) R(r)$$

$$= \int_0^{\infty} (r^2 R(r) dR(r) + r dr R^2(r))$$

$$= \int_0^{\infty} r R(r) [r dR(r) + dr R(r)]$$

$$= \int_0^{\infty} (r R(r)) d(r R(r)) = \frac{1}{2} (r R(r))^2 \Big|_0^{\infty}$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} r R(r) = \lim_{r \rightarrow \infty} r R(r) = 0$$

olduğu için de  $\langle K \rangle = 0$  sağlanır.

$\langle \sqrt{f(r)} K \sqrt{f(r)} \rangle$  için ise  $\sqrt{f(r)}$  fonksiyonu  $R(r)$  ile gruplanarak aynı şey elde edilir. Ancak bu durumda

$$\lim_{r \rightarrow 0} \sqrt{f(r)} r R(r) = \lim_{r \rightarrow \infty} \sqrt{f(r)} r R(r) = 0$$

olması gerekir. Eldeki bu ipucu ile artık  $SU(1,1)$  grubunun jeneratörlerinin  $r$  ve  $K$  eşlenik değişkenlerine bağlı olarak inşasına geçilebilir.

### V.3) $SU(1,1)$ Jeneratörlerinin İnşası ve İndirgenmeler :

Bütün kararlı bağlı durumlarda beklenen değeri sıfır olan  $\sqrt{f(r)} K \sqrt{f(r)}$  operatörü  $[K, \phi(r)] = -i\phi'(r)$  bağıntısı kullanılarak  $f(r)K - \frac{i}{2}f'(r)$  olarak da yazılabilir.

$$\langle f(r)K - \frac{i}{2}f'(r) \rangle = 0 \text{ denkleminin grup teorik}$$

izahı, bu ifadenin  $\Gamma_+$  ve  $\Gamma_-$  operatörlerinin bir lineer kombinezonu oluşudur. Hatırlanacağı gibi  $\Gamma_{\pm}$  operatörleri, işlevleri gereği

$$\langle \Gamma_+ \rangle = \langle \Gamma_- \rangle = 0$$

denklemini sağlarlar.  $\Gamma_+$  ve  $\Gamma_-$  operatörlerinin lineer kombinezonu olmak, doğal olarak  $\Gamma_+$  ve  $\Gamma_-$  operatörlerinin lineer kombinezonu olmağa eşdeğerdir. Grup jeneratörleri gene sadece grup elemanlarını içeren dönüşümlerle birbirlerine dönüşebildiklerine göre genellikle ayrılmadan

$$T \equiv f(r)K - \frac{i}{2} f'(r)$$

denebilir. Schrödinger denkleminde  $K$ , sadece  $K^2$  olarak bulunduğuna göre  $\Gamma_4$  ve  $\Gamma_c$   $K$  cinsinden kuadratik olarak inşa edilmelidir. Böylece  $SU(1,1)$  grubunun jeneratörleri  $\Phi_{\alpha\beta} = \Phi_{\alpha\beta}(r)$  olmak üzere

$$\Gamma_4 = \Phi_{12} K^2 + \Phi_{11} K + \Phi_{10}$$

$$T = \Phi_{21} K + \Phi_{20}$$

$$\Gamma_c = \Phi_{32} K^2 + \Phi_{31} K + \Phi_{30}$$

şeklinde yazılırlar. Hesaplara geçmeden önce bu ifadeleri elden geldiğince indirgemek ve bağımsız  $\Phi_{\alpha\beta}$  'ların sayısını en aza indirmek gerekir. En önce Casimir operatörü

$$\Gamma^2 = -\Gamma_4^2 - T^2 + \Gamma_c^2$$

'nin  $K^4$  'lü terim içermemesi gereğinden

$$\Phi_{12} = \Phi_{32} = F(r)$$

elde edilir. Bundan sonra komütasyon bağıntılarını ve jeneratörlerin biçimini bozmayan

$$\Gamma \longrightarrow e^{-ig(r)} \Gamma e^{ig(r)}$$

gibi bir benzerlik dönüşümünde

$$g'(r) = -\frac{\Phi_{11}}{2\Phi_{21}}$$

seçilerek yeni gösterimde  $\Phi_{11} = 0$  olması sağlanır. <sup>(20)</sup> Böylece

$$\Gamma_4 = F(r)K^2 + \Phi_{10}$$

$$T = \Phi_{21}K + \Phi_{20}$$

$$\Gamma_0 = F(r)K^2 + \Phi_{31}K + \Phi_{30}$$

bulunur. Son olarak da Casimir operatörünün  $K^3$ 'lü terimi de içermemesi gereğinden  $\Phi_{31}=0$  elde edilir.

İleride hesap kolaylığı sağlaması bakımından iki bağımsız fonksiyon

$$\Phi_{10} \equiv H(r) - \frac{G(r)}{4}$$

$$\Phi_{30} \equiv H(r) + \frac{G(r)}{4}$$

olarak tanımlanır ve

$$T = -i [\Gamma_0, \Gamma_4]$$

bağıntısının da yardımıyla

$$\Gamma_4 = F(r)K^2 + H(r) - \frac{G(r)}{4}$$

$$T = F(r)G'(r) - \frac{i}{2}F(r)G''(r)$$

$$\Gamma_0 = F(r)K^2 + H(r) + \frac{G(r)}{4}$$

elde edilir. Burada bağımsızmış gibi görünen  $F(r), H(r), G(r)$  fonksiyonlarının

$$[\Gamma_4, T] = -i\Gamma_0$$

$$[T, \Gamma_0] = i\Gamma_4$$



komütasyon bağıntılarını sağlamaları gerektiği ve Casimir operatörünün sabit olma koşulu da hatırdta tutulmalıdır.

Detayları ekte sunulan hesaplarada bu koşulların sağlanmasıyla her şey tek fonksiyona indirgenerek (Ek V)

$$F = \frac{G}{G'^2}$$

$$H = \frac{3}{4} \frac{GG''^2}{G'^4} - \frac{1}{2} \frac{GG'''}{G'^3} + \frac{\lambda(\lambda+1)}{G}$$

ve

$$\Gamma_4 = \frac{G}{G'^2} K^2 + \frac{3}{4} \frac{GG''^2}{G'^4} - \frac{1}{2} \frac{GG'''}{G'^3} + \frac{\lambda(\lambda+1)}{G} - \frac{G}{4}$$

$$T = \frac{G}{G'} K - \frac{i}{2} \frac{GG''}{G'^2}$$

$$\Gamma_0 = \frac{G}{G'^2} K^2 + \frac{3}{4} \frac{GG''^2}{G'^4} - \frac{1}{2} \frac{GG'''}{G'^3} + \frac{\lambda(\lambda+1)}{G} + \frac{G}{4}$$

elde edilirler. Artık Schrödinger denklemi bu operatörler yardımıyla çözülebilir.

#### V. 4) Schrödinger Denklemine Uygulama

Kullanılacak olan yöntemin esasının Schrödinger denklemini bir fonksiyonla çarptıktan sonra  $SU(1, 1)$  grubunun jeneratörleri cinsinden lineer olarak ifade edilmesi ol-

duğu belirtilmişti. Jeneratörlerin biçiminden Schrödinger denklemini  $\frac{G}{G'^2}$  fonksiyonu ile çarpmak gerektiği ve sonucu  $\Gamma$  'lar cinsinden lineer olarak ifade etmek işleminde  $T$  'nin yer almayacağı açıktır.

$$\left[ \frac{G}{G'^2} K^2 + \frac{G}{G'^2} (V(r) - \epsilon) \right] |5\rangle = 0$$

denklemini  $\left[ \alpha \Gamma_4 + \beta \Gamma_0 + \gamma \right] |5\rangle = 0$

biçiminde yazmak için  $\alpha + \beta = 1$  olması gerekir.  $\beta - \alpha \equiv \sigma^2$  tanımı ile de

$$\left[ \frac{G}{G'^2} K^2 + \frac{3}{4} \frac{GG''^2}{G'^4} - \frac{1}{2} \frac{GG'''}{G'^3} + \frac{\lambda(\lambda+1)}{G} + \frac{\sigma^2 G}{4} + \gamma \right] |5\rangle = 0$$

bulunur. Bu ifade

$$\left[ \frac{G}{G'^2} K^2 + \frac{G}{G'^2} (V(r) - \epsilon) \right] |5\rangle = 0$$

denklemini ile karşılaştırılarak ilk önemli sonuç,

$$\frac{3}{4} \frac{G''^2}{G'^2} - \frac{1}{2} \frac{G'''}{G'} + \lambda(\lambda+1) \frac{G'^2}{G^2} + \gamma \frac{G'^2}{G} + \frac{\sigma^2}{4} G'^2 = \frac{2mV(r)}{\hbar^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2m\epsilon}{\hbar^2}$$

elde edilir. Ancak bu denklem kuantizasyon şartını içermediği için yetersizdir. Ekte görülebileceği biçimde (Ek 6)

$$\left[ \alpha \Gamma_4 + \beta \Gamma_0 + \gamma \right] |5\rangle = 0$$

denkleminin  $\left[ \sqrt{\beta^2 - \alpha^2} \Gamma_0 + \gamma \right] |7\rangle = 0$

hâline dönüştürülmesi ve  $\sqrt{\beta^2 - \alpha^2} = \sigma$  kullanılarak

$$\text{Spektrum } (\Gamma_0) = \nu + \lambda + 1 = -\frac{\gamma}{\sigma}$$

elde edilmesi ile amaca ulaşılmış olunur.

Böylece yöntemin özü

$$\frac{3}{4} \frac{G'^2}{G^2} - \frac{1}{2} \frac{G'''}{G'} + \lambda(\lambda+1) \frac{G'^2}{G^2} + \gamma \frac{G'^2}{G} + \frac{\sigma^2}{4} G'^2 = \frac{2mV(r)}{\hbar^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (v.1)$$

denkleminde  $\lambda$ ,  $\sigma$  ve  $\gamma$  parametrelerini tayin etmek ve bu parametreleri

$$\nu + \lambda + 1 = -\frac{\gamma}{\sigma} \quad (v.2)$$

ifadesine yerleştirip enerji spektrumunu elde etmektir.

Verilen her  $V(r)$  potansiyel ifadesi için (V.5.1) gibi karmaşık bir nonlinear diferansiyel denklemi çözmek mümkün olmadığına göre ilk aşamada denklemin sağ tarafındaki tek sabit terim olan  $-\frac{2mE}{\hbar^2}$  'ye karşılık  $\frac{\sigma^2}{4} G'^2$

$\gamma \frac{G'^2}{G}$  ve  $\lambda(\lambda+1) \frac{G'^2}{G^2}$  terimleri, teker teker <sup>sabite</sup> eşitle-

nerek bulunan  $G$  fonksiyonları yardımı ile çok iyi bilinen üç problemin çözümüne geçilebilir.

#### V.5) Örnekler

$G(r)$  fonksiyonu saptama işleminin ilginç bir yanı  $G'$ yi bir sabitle çarpmanın fiziksel sonuçları etkilememesidir. Bunun sebebi ise denkleminde <sup>(v.5.1)</sup>  $\sigma$  ve  $\gamma$  gibi sonradan belirlenecek iki parametreyle çarpılan  $G'^2$  ve  $\frac{G'^2}{G}$  terimleri dışında bütün terimlerin pay ve paydalarında aynı sayıda  $G(r)$  fonksiyonu bulunmasıdır. Bu anlayışla en basit şekliyle elde edilen  $G(r)$  fonksiyonları ve diğer sonuçları tabloda sunulmaktadır.

Denklem	$-\frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{\sigma^2}{4} G'G'$
G	r
(V.5.1) Denkleminin yeni biçimi	$\frac{\lambda(\lambda+1)}{r^2} + \frac{\gamma}{r} + \frac{\sigma^2}{4} =$ $\frac{2mV(r)}{\hbar^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2mE}{\hbar^2}$
Çözülebilecek V(r)	$\sim \frac{1}{r} \longrightarrow -\frac{e^2}{r}$ (Hidrojen atomu)
$\lambda$	$\ell$
$\gamma$	$-\frac{2me^2}{\hbar^2}$
$\sigma$	$\frac{\sqrt{-8mE}}{\hbar}$
F	r
H	$\frac{\ell(\ell+1)}{r}$
Jeneratörler	$\Gamma_+ = rK^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{r} - \frac{r}{4}$ $T = rK$ $\Gamma_- = rK^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{r} + \frac{r}{4}$
(V.5.2) Denklemi	$\nu + \ell + 1 = \frac{2me^2/\hbar^2}{\sqrt{-8mE}/\hbar}$
Enerji Spektrumu	$E = -\frac{m e^4}{2 \hbar^2 (\nu + \ell + 1)^2}$

Denklem	$-\frac{2mE}{\hbar^2} = \gamma \frac{G'G'}{G}$
G	$r^2$
(V.5.1) Denkleminin yeni biçimi	$\frac{4\lambda(\lambda+1)+3/4}{r^2} + 48 + \sigma^2 r^2$ $= -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2mE}{\hbar^2}$
Çözülebilir V(r)	$\sim r^2 \rightarrow \frac{1}{2} m \omega^2 r^2 \text{ (SHO)}$
$\lambda$	$\frac{\ell}{2} - \frac{1}{4}$
$\gamma$	$- \frac{mE}{2\hbar^2}$
G	$\frac{mW}{\hbar}$
F	$\frac{1}{4}$
H	$\frac{\ell(\ell+1)}{4r^2}$
Jeneratörler	$\Gamma_+ = \frac{1}{4} K^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{4r^2} - \frac{r^2}{4}$ $T = \frac{1}{2} rK - i/4$ $\Gamma_- = \frac{1}{4} K^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{4r^2} + \frac{r^2}{4}$
(V.5.2) Denklemi	$2\nu + \frac{\ell}{2} + \frac{3}{4} = \frac{mE/2\hbar^2}{mW/\hbar}$
Enerji Spektrumu	$E = (2\nu + \ell + 3/2) \hbar W$

Denklem	$-\frac{2mE}{\hbar^2} = \lambda(\lambda+1) \frac{G'G'}{G^2}$
G	$e^{-ar} \quad (21)$
(V.5.1) Denkleminin yeni biçimi	$\begin{aligned} & (\lambda+1/2)^2 a^2 + \gamma a^2 e^{-ar} + \frac{\sigma^2}{4} a^2 e^{-2ar} \\ & = \frac{2mV(r)}{\hbar^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2mE}{\hbar^2} \end{aligned}$
Çözülebiyecek V(r)	$V_0 \left[ e^{-2a(r-r_0)} - 2be^{-a(r-r_0)} \right]$ MORSE POTENTIAL $\ell = 0$
$\lambda$	$\frac{\sqrt{-2mE'}}{\hbar a} - \frac{1}{2}$
$\gamma$	$-\frac{4mV_0 b e^{ar_0}}{\hbar^2 a^2}$
$\sigma$	$\frac{\sqrt{8mV_0'} e^{ar_0}}{\hbar a}$
F	$\frac{e^{ar}}{a^2}$
H	$\frac{\sqrt{-2mE'}}{\hbar a} e^{ar}$
İeneratörler	$\begin{aligned} \Gamma_4 &= \frac{e^{ar}}{a^2} K^2 + \frac{\sqrt{-2mE'}}{\hbar a} e^{ar} - \frac{e^{ar}}{4} \\ T &= -K/a - 1/2 \\ \Gamma_0 &= \frac{e^{ar}}{a^2} K^2 + \frac{\sqrt{-2mE'}}{\hbar a} e^{ar} + \frac{e^{-ar}}{4} \end{aligned}$
(V.5.2) Denklemi	$\frac{4mV_0 b e^{ar_0}/\hbar^2 a^2}{\sqrt{8mV_0'} e^{ar_0}/\hbar a} = \gamma + \frac{\sqrt{-2mE'}}{\hbar a} + \frac{1}{2}$
Enerji Spektrumu	$E = -\frac{\hbar^2 a^2}{2m} \left[ \frac{\sqrt{2mV_0'} b}{\hbar a} - (\gamma + 1/2) \right]^2$

Bulunan sonuçlar sadece potansiyelleri belirlemekle kalmayıp her hal için enerji spektrumlarını da başarılı bir şekilde ortaya koymuştur.

Analiz yoluyla bulduğumuz sonuçlarla karşılaştırma yapıldığında tam bir uygunluk olduğu ortadadır. Böylece analiz ve grup teorik yaklaşımlar arasında belirgin bir ilinti olduğu gösterilmiştir. Analiz yoluyla bulduğumuz ( IV.7 ) denklemi ile spektrum üreten  $SU( 1,1 )$  Lie cebirini kullanarak bulduğumuz ( V.5.1 ) denklemi tamamen birbirinin aynı olan sonuçları vermektedir.

## VI . SONUÇ

Verilen herhangi ikinci dereceden bir diferansiyel invar-  
yant formda ifade edilip değişken dönüşümü uygulanarak  
yeni bir şekle sokuldu. Ancak bu sırada invaryantlık bo-  
zulduğu için yeni bir düzenleme ile operatör genel Schrö-  
dinger denklemi ile kıyaslanabilecek hale

$$\Lambda_G = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2} S(G) + \left( -\left(\frac{F_1}{2F_2}\right)' - \left(\frac{F_1}{2F_2}\right)^2 + \frac{F_0}{F_2} \right) \right\}$$

getirildi. Schrödinger operatörü ile

$$\Lambda_S = \left\{ 1, 0, -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \right\}$$

karşılaştırma yapılarak lineer olmayan bir diferansiyel  
denklem elde edildi. Fiziksel sonuçlara varmak için  
" sabitlerin eşleştirilmesi " adını verdiğimiz yöntem  
kullanılarak denklemi tamamen çözülebilir kılan potansi-  
yel sınıfları elde edildi. Son olarak  $SU(1,1)$  Lie cebri  
ve spektrumu kullanılarak konfluent hipergeometrik denkle-  
m için bulduğumuz sonuçlarla, analiz yoluyla bulduğumuz  
sonuçların bir karşılaştırılması yapıldı. Neticelerin  
tam bir uyum içinde olduğu görülerek analiz ve grup teo-  
rik yöntemler arasındaki uyum vurgulandı.



VII. KAYNAKLAR VE NOTLAR

- (1) E. Schrödinger, Proc. R.I.A., 46 A ( 1940 ) 9
- (2) E. Schrödinger, Proc. R.I.A., 47 ( 1941 ) 53
- (3) P. M. Morse, H. Feshbach, Method of Theoretical Physics, McGraw-Hill, 1953
- (4) Rainville, Intermediate Differential Equations, Chelsea Publishing Company, N.Y. (1972) Chapter 6 , chapter 7
- (5) G. Birkhoff, G. C. Rota, Ordinary Differential Equations, Blaizdel Publishing Co, ( 1969 ) 129
- (6) A. Aşkar, Methods in Applied Algebra and Analysis B.U., İstanbul, PartII ( 1978 ) 261
- (7) P. M. Morse, Physical Rev. 34 (1929) 57
- (8) L. I. Schiff Quantum Mechanics, Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd. Tokyo 3.ed.(1968) 452
- (9) Woods R.D., Saxon D.S., Physical Rev. 95 (1954) 577  
Hornyak W.F.,
- (10) Nuclear Structure, Academic Press (1975) 245
- (11) A. Bohr, B.R. Mottelson, Nuclear Structure, W.A. Benjamin Inc., V.I. (1969) 222
- (12) A. O. Barut, Dynamical Groups and Generalized Symmetries in Quantum Theory, University of Gan-

terbury Publications, Christchurch (1972)

- (13) B. G. Wybourne, Classical Groups for Physicists,  
John Willey ( 1974 )
- (14) P. Budini, Nuova Cimento 64 A ( 1966 ) 363
- (15) P. Cordero, S. Hojman, Lett. Nuovo Cimento 4  
( 1970 ) 1123
- (16) P. Cordero, G. C. Ghirardi, Nuovo Cimento 2A  
( 1971 ) 217
- (17) P. Cordero, S. Hojman, P. Furlan, G. C. Ghirardi,  
Nuovo Cimento 3A ( 1971 ) 807
- (18) A. O. Barut, G. L. Bornzin, J. Math. Phy. 12(1971)841
- (19) A. O. Barut, C. Fronzda, Proc. Roy. Soc. A287  
(1965) 532
- (20) A. O. Barut, H. Beker, D. Dibekçi, B. Ü. Journal  
V 8-9 (1980-1981) 11
- (21) Bu koşul sonucu elde edilen  $G = e^{-ar}$ , (V.5.1) denklemindeki  $\frac{3}{4} \frac{G''^2}{G'^2}$  ve  $-\frac{1}{2} \frac{G'''}{G'}$  terimlerini de sabit yaptığı için eşitlik değil oran kullanılmıştır.

## EK I

$$F_2 \Psi'' + (2F_2 \frac{S'}{S} + F_1) \Psi' + (F_2 \frac{S''}{S} + F_1 \frac{S'}{S} + F_0) \Psi = 0$$

ifadesinde

$$\frac{S'}{S} = \frac{F_2' - F_1}{2F_2}$$

$$\frac{S''}{S} = \frac{F_2'' - F_1'}{2F_2} + \frac{F_1^2 - F_2'^2}{4F_2^2}$$

değerleri kullanıldığında eşitlik

$$F_2 \Psi'' + F_2' \Psi' + \left( \frac{F_2'' - F_1'}{2F_2} - \frac{(F_2' - F_1)^2}{4F_2^2} + \frac{2F_1 F_2' - 2F_2^2}{4F_2^2} + F_0 \right) \Psi = 0$$

olmaktadır. Kısaltmalar yapıp düzenlendiğinde

$$\Psi'' + \frac{F_2'}{F_2} \Psi' + \left( \frac{F_2'' - F_1'}{2F_2} + \frac{(F_2' - F_1)^2}{4F_2^2} + \frac{F_0}{F_2} \right) \Psi = 0$$

(II.5) denklemini elde edilmektedir.

## EK II

$$S(G) = \frac{1}{2} \frac{G'''}{G'} - \frac{3}{4} \frac{G''^2}{G^2} = 0$$

yapıldığında yeni bir düzenleme ile

$$\frac{G'''}{G''} = \frac{3}{2} \frac{G''}{G'}$$

olur. İntegral alındığında

$$\ln G'' = \frac{3}{2} \ln G' + \ln a$$

veya

$$G'' = a G'^{3/2}$$

olacaktır. Değişken dönüşümü yaparak  $G' = y$  dersek

$$y' = a y^{3/2} \quad \text{yani} \quad \frac{dy}{dx} = a y^{3/2} \quad \text{veya} \quad y^{-3/2} dy = a dx$$

elde edilir.

$$\int y^{-3/2} dy = \int a dx$$

integral hesabı yapılnca

$$y = \frac{1}{(ax+b)^2} = G'$$

bulunur. İkinci bir integral işlemi yapılrırsa

$$G = -\frac{1}{a(ax+b)} + c$$

gibi bir ifade elde edilir ki değişik bir düzenleme ile

$$G = \frac{a^2cx + abc - 1}{a^2x + ab} \equiv \frac{Ax + B}{Cx + D}$$

bulunabilir.

### EK III

Eşitlik (III.7) 'deki hipergeometrik diferansiyel denklemin çarpan fonksiyonları

$$F_1 = z(1-z)$$

$$F_2 = c - (a+b+1)z$$

$$F_0 = -ab$$

olduğundan denklemi (II.8) 'deki invaryant formda yazmak için

$$\frac{F_1}{2F_2} = \frac{c/2}{z} + \frac{(c-a-b-1)/2}{1-z}$$

$$\frac{F_0}{F_2} = -\frac{ab}{z(1-z)}$$

ifadeleri bulunup, denklemdaki şekilleriyle

$$\left(\frac{F_1}{2F_2}\right)' = -\frac{c/2}{z^2} - \frac{(c-a-b-1)/2}{(1-z)^2}$$

$$\left(\frac{F_1}{2F_2}\right)^2 = \frac{c^2/4}{z^2} + \frac{(c-a-b-1)^2/4}{(1-z)^2} + \frac{c(c-a-b-1)/4}{z(1-z)}$$

elde edilip yerine konduğunda (IV.7) ile karşılaştırma yapmak yeterli olmaktadır.

$$\frac{c/2}{z^2} - \frac{(c-a-b-1)/2}{(1-z)^2} - \frac{c^2/4}{z^2} - \frac{(c-a-b-1)^2/4}{(1-z)^2} - \frac{c(c-a-b-1)/4}{z(1-z)} - \frac{ab}{z(1-z)} \equiv \frac{A}{z^2} + \frac{B}{z(1-z)} + \frac{C}{(1-z)^2}$$

Katsayılar arasındaki ilişki

$$A = \frac{c}{2} - \frac{c^2}{4} \quad ; \quad B = -ab - \frac{c(c-a-b-1)}{2}$$

$$C = -\frac{(c-a-b-1)}{2} - \frac{(c-a-b-1)^2}{4}$$

şeklinde elde edilebilmektedir.

#### EK IV

(IV.8) denklemini için (IV.9) şartının geçerli olması halinde:

$$G = \text{Cosh}^2 ar$$

$$G' = 2a \text{Cosh} ar \text{Sin} ar$$

$$G'' = 2a^2 (\text{Cosh}^2 ar + \text{Sin}^2 ar)$$

$$G''' = 2a^2 (2a \cdot 2a \text{Cosh} ar + 2a \cdot 2a \text{Sin} ar \text{Cosh} ar) \\ = 4a^2 G'$$

ifadeleri ( IV.8 ) denkleminde yerine konduğunda

$$\frac{1}{2} \frac{4a^2 G'}{G'} - \frac{3}{4} \frac{4a^4 (\cosh^2 ar + \sinh^2 ar)^2}{4a^2 \sinh^2 ar \cdot \cosh^2 ar} + A \frac{4a^2 \sinh^2 ar \cdot \cosh^2 ar}{\cosh^4 ar}$$

$$+ B \frac{4a^2 \sinh^2 ar \cdot \cosh^2 ar}{\cosh^2 ar (1 - \cosh^2 ar)} + C \frac{4a^2 \sinh^2 ar \cdot \cosh^2 ar}{(1 - \cosh^2 ar)^2} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

olur.  $\cosh^2 ar - \sinh^2 ar = 1$  kullanılarak gerekli kısaltmalar yapılır. Sonuçta:

$$2a^2 - \frac{3a^2}{4} \frac{\cosh^4 ar + 2\sinh^2 ar \cosh^2 ar + \sinh^4 ar}{\sinh^2 ar \cosh^2 ar} + 4a^2 C \cotanh^2 ar$$

$$+ 4a^2 A \tanh^2 ar - 4a^2 B = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

elde edilir. Şimdi uygun bir guruplandırma yapıлып,

$$\tanh^2 ar \left( 4a^2 A - \frac{3a^2}{4} \right) + \cotanh^2 ar \left( 4a^2 C - \frac{3a^2}{4} \right) -$$

$$4a^2 B + \frac{a^2}{2} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

bulunur.

$$G(r) = \cos^2 ar$$

alınması halinde,

$$G'(r) = -2a \cos ar \cdot \sin ar$$

$$G''(r) = -2a^2 (-\sin^2 ar + \cos^2 ar)$$

$$G'''(r) = -2a^2 (-2a \sin ar \cdot \cos ar - 2a \sin ar \cdot \cos ar)$$

$$= 4a^2 G'(r)$$

ifadeleri ( IV.8 ) denkleminde yerine konduğunda

$$-\frac{1}{2} \frac{4a^2 G'}{G'} - \frac{3}{4} \frac{4a^4 (\cos^2 ar + \sin^2 ar)^2}{4a^2 \cos^2 ar \cdot \sin^2 ar} + A \frac{4a^2 \cos^2 ar \cdot \sin^2 ar}{\cos^4 ar}$$

$$+ B \frac{4a^2 \cos^2 ar \cdot \sin^2 ar}{\cos^2 ar (1 - \cos^2 ar)} + C \frac{4a^2 \cos^2 ar \cdot \sin^2 ar}{(1 - \cos^2 ar)^2} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

olur.  $\sin^2 ar + \cos^2 ar = 1$  kullanılarak gerekli kısaltmalar yapıldığında,

$$-2a^2 - \frac{3a^2}{4} \frac{\cos^4 ar + 2\sin^2 ar \cos^2 ar + \sin^4 ar}{\sin^2 ar \cdot \cos^2 ar} + 4a^2 A \tan^2 ar +$$

$$+ 4a^2 C \cotan^2 ar + 4a^2 B = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

elde edilir. Gruplandırma sonunda:

$$\tan^2 ar \left( 4a^2 A - \frac{3a^2}{4} \right) + \cotan^2 ar \left( 4a^2 C - \frac{3a^2}{4} \right) +$$

$$4a^2 B - \frac{a^2}{2} = -\frac{2mV(r)}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}$$

olduğu görülür.

EK V

$$\Gamma_4 = FK^2 + H - \frac{G}{4}$$

$$T = FG'K - \frac{i}{2} FG''$$

$$\Gamma_0 = FK^2 + H + \frac{G}{4}$$

jeneratörlerinin

$$[\Gamma_4, T] = -i\Gamma_0$$

$$[T, \Gamma_0] = i\Gamma_4$$

komütasyon bağıntılarını veya buna eşdeğer olan

$$[T, (\Gamma_0 - \Gamma_4)] = -i(\Gamma_0 - \Gamma_4)$$

$$[T, (\Gamma_0 + \Gamma_4)] = i(\Gamma_0 + \Gamma_4)$$

şartlarını sağlaması gerekir. Bunlardan ilki

$$[FG'K - \frac{i}{2} FG'', \frac{G}{2}] = -i \frac{G}{2}$$

$$FG'[K, G] = -iG$$

$$FG'(-iG') = -iG$$

veya  $F = \frac{G}{G'^2}$  olarak basitleşir.

Bu arada  $FG' = \frac{G}{G'}$  ifadesinin türevinden

$$FG'' + F'G' = 1 - \frac{GG''}{G'^2}$$

$F = \frac{G}{G'^2}$  ifadesinin türevinden ise  $F' = \frac{1}{G'} - \frac{2GG''}{G'^3}$  elde edilir. Böylece

$$\begin{aligned} FG'' &= 1 - \frac{GG''}{G'^2} - F'G' \\ &= \left(1 - \frac{GG''}{G'^2}\right) - \left(1 - \frac{2GG''}{G'^2}\right) \\ &= \frac{GG''}{G'^2} \end{aligned}$$

bulunur ve  $T$ ,  $F(r)$  'dan bağımsız olarak

$$T = \frac{G}{G'} K - \frac{i}{2} \frac{GG''}{G'^2}$$

şeklinde yazılır.

İkinci komütatöre geçmeden, ve ona gerek bırakmayacak şekilde, Casimir operatörünün  $\lambda(\lambda+1)$  sabitine eşitliği şartına geçilerek:



$\Gamma^2 = (\Gamma_0 - \Gamma_4)(\Gamma_0 + \Gamma_4) - iT + T^2$  ifadesi

$$\frac{G^2}{G'^2} K^2 + GH - i \frac{G}{G'} K - \frac{1}{2} \frac{GG''}{G'^2} - \left( \frac{G}{G'} K - \frac{i}{2} \frac{GG''}{G'^2} \right)^2 = \lambda(\lambda+1)$$

veya

$$\begin{aligned} & \frac{G^2}{G'^2} K^2 + GH - i \frac{G}{G'} K - \frac{1}{2} \frac{GG''}{G'^2} - \frac{G}{G'} K \frac{G}{G'} K \\ & + \frac{i}{2} \frac{G}{G'} K \frac{GG''}{G'^2} + \frac{i}{2} \frac{GG''}{G'^2} \frac{G}{G'} K + \frac{1}{4} \frac{G^2 G''^2}{G'^4} = \lambda(\lambda+1) \end{aligned}$$

olarak yazılır. Bu noktada

$$K \frac{G}{G'} = \frac{G}{G'} K + \left[ K, \frac{G}{G'} \right] = \frac{G}{G'} K - i \left( 1 - \frac{GG''}{G'^2} \right)$$

$$K \frac{GG''}{G'^2} = \frac{GG''}{G'^2} K - i \left( \frac{G''}{G'} + \frac{GG'''}{G'^2} - \frac{2GG''^2}{G'^3} \right)$$

kullanılarak

$$\begin{aligned} & \frac{G^2}{G'^2} K^2 + GH - i \frac{G}{G'} K - \frac{1}{2} \frac{GG''}{G'^2} - \frac{G^2}{G'^2} + i \left( 1 - \frac{GG''}{G'^2} \right) + \frac{i}{2} \frac{G^2 G'}{G'^3} K \\ & + \frac{1}{2} \frac{G}{G'} \left( \frac{G''}{G'} + \frac{GG'''}{G'^2} - \frac{2GG''^2}{G'^3} \right) + \frac{i}{2} \frac{GG''}{G'^3} K + \frac{1}{4} \frac{G^2 G''^2}{G'^4} = \lambda(\lambda+1) \end{aligned}$$

denkleminde  $K^2$  ve  $K$  terimlerinin sadeleştiği görülmür, ve şart

$$GH + \frac{1}{2} \frac{G^2 G'''}{G'^3} - \frac{3}{4} \frac{G^2 G''^2}{G'^4} = \lambda(\lambda+1)$$

biçimine dönüştür. Bundan da

$$H = \frac{3}{4} \frac{G^2 G''^2}{G'^4} - \frac{1}{2} \frac{G^2 G'''}{G'^3} + \frac{\lambda(\lambda+1)}{G}$$

elde edilir.

$$[T, (\Gamma_0 + \Gamma_4)] = i(\Gamma_0 + \Gamma_4)$$

komütatörü ise yeni hiçbir şey vermemektedir.

#### EK VI

Baker-Hausdorf bağıntısı

$$e^A B e^{-A} = B + [A, B] + \frac{1}{2!} [A, [A, B]] + \dots$$

yardımla

$$e^{-iTu} \Gamma_4 e^{iTu} = \Gamma_4 \text{Cosh}u + \Gamma_0 \text{Sinhu}$$

ve bu ifadenin de  $w$ 'ya göre türevi alınarak

$$\bar{e}^{iTu} (i[\Gamma_4, T]) e^{iTu} = \bar{e}^{-iTu} \Gamma_0 e^{iTu} = \Gamma_4 \text{Sinhu} + \Gamma_0 \text{Coshu}$$

elde edilir. Bu yöntemle  $\alpha \Gamma_4 + \beta \Gamma_0$  ifadesi

$$\alpha (\Gamma_4 \text{Cosh}u + \Gamma_0 \text{Sinhu}) + \beta (\Gamma_4 \text{Sinhu} + \Gamma_0 \text{Cosh}u) =$$

$$- (\alpha \text{Cosh}u + \beta \text{Sinhu}) \Gamma_4 + (\alpha \text{Sinhu} + \beta \text{Cosh}u) \Gamma_0$$

biçimine dönüştürülürse  $\Gamma_4$  terimini yok etmek için

$$\text{Cosh}u = \frac{\beta}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}} \quad ; \quad \text{Sinhu} = \frac{-\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}$$

seçimini yapmak gerekir. Bu seçimle de  $\Gamma_0 (\alpha \text{Sinhu} + \beta \text{Cosh}u)$  ifadesi

$$\sqrt{\beta^2 - \alpha^2} \Gamma_0 \quad \text{olur.}$$

## ÖZGEÇMİŞİM

1948 yılında İzmit'te doğdum. İlkokulu Adapazarında bitirip Arifiye İlköğretmen Okuluna girdim. İlköğretmen Okulunun beşinci sınıfından sonra İzmir Yüksek Öğretmen Okulunun hazırlık sınıfına giderek lise öğrenimimi orada tamamladım. Girdiğim Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümünü 1969 yılında bitirdim. Sekiz yıl sırasıyla Kayseri, İzmit ve İstanbul'da lise fizik öğretmenliği yaptıktan sonra, 1977 yılında Kocaeli D. M. M. Akademisinde fizik asistanlığına ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde lisansüstü programına girdim. Şubat 1980 'de Fizik Master derecesi alarak doktora çalışmalarına başladım. Halen Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde fizik araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım.

